








Dosierempfehlung für die Verwendung mit:

Ameisensäure 60 %

Kurzbehandlung	Volk einzargig	Volk zweizargig
Dosierung	9,2 ml Ameisen- säure pro Wabe	6,4 ml Ameisen- säure pro Wabe
Beispiel (empf. Menge)	11 Waben x 9,2 ml ~ 100 ml	22 Waben x 6,4 ml ~ 140 ml
Skala-Einstellung Behandl. von oben (Zentrum geschl.)	 2	 2 1/2
Skala-Einstellung Behandl. v. unten (Zentrum geschl.)	 2 1/2	 3
Behandlungszeit	Juli/August¹ - nach der Honigentnahme	
Behandlungsdauer	5 - 7 Tage	5 - 7 Tage

Langzeitbehandl.	Volk einzargig	Volk zweizargig
Dosierung	16 ml Ameisen- säure pro Wabe	12 ml Ameisen- säure pro Wabe
Beispiel (empf. Menge)	11 Waben x 16 ml = 176 ml (180-200ml)	22 Waben x 12 ml = 264 ml (260-270ml)
Skala-Einstellung Behandl. von oben	 2 1/2	 3-4*
Skala-Einstellung Behandl. von unten	 3 1/2	 4*
Behandlungszeit	September¹ - nach der Auffütterung	
Behandlungsdauer	10 - 15 Tage	10 - 15 Tage

Nachbehandlung	Volk einzargig	Volk zweizargig
Dosierung	10,8 ml Ameisen- säure pro Wabe	7,2 ml Ameisen- säure pro Wabe
Beispiel (empf. Menge)	11 Waben x 10,8 ml ~ 120 ml	22 Waben x 7,2 ml ~ 160 ml
Skala-Einstellung Behandl. von oben (Zentrum geschl.)	 3	 4
Skala-Einstellung Behandl. v. unten (Zentrum offen)	 3*	 4*
Behandlungszeit	Sept.-Okt. - 2 Wochen nach letzter Behandl.	
Behandlungsdauer	7 Tage	7 Tage

* Zentrum offen bei Stocktemperatur unter 15 °C. Trifft meist zu, wenn sich die Bienen auf eine lockere 'Traube' zusammenziehen.

Monatsangaben können lokal gravierend abweichen.